

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/pulsoksymetr-napalcowy-medyczny-pr-870-p-408132.html>BRAK
ZDJĘCIA

Pulsoksymetr napalcowy medyczny PR-870

Cena brutto	54,99 zł
Cena netto	50,92 zł
Numer katalogowy	HPPRXCIPROPR870
Kod producenta	PR-870
Kod EAN	5902211120360
Uwaga	CE+WEEE
Zasilanie (lista)	Baterie
Gwarancja	24 mc.
Pozostałe parametry wyświetlacza	- Dokładność pomiaru: - Dokładność SpO2: 70%-100%: +/-2 cyfry; 0% - 69%: nieokreślony - Zakres wyświetlania SpO2: 30%-99% - Rozdzielczość SpO2: 1%. - Deklarowana dokładność PR: 25-250 bpm: +/-3 cyfry - Rozdzielczość PR: 1 bpm - Parametry otoczenia: - Temp
Akcesoria w zestawie	Pulsoksymetr napalcowy medyczny pulsometr oksymetr Promedix PR-870 Smycz Instrukcja obsługi Oryginalne opakowanie
Wymiary	Szer. x Wys. x Głęb.: 57 x 30 x 31 mm
Funkcje (pulsoksymetry)	Automatyczne wyłączenie po wyciągnięciu palca
Zakres pomiaru saturacji	0 - 100%
Zakres pomiaru tętna	30 - 250
Ilość trybów wyświetlania	1
Rodzaj (pulsoksymetr)	napalcowy
Rozdzielczość	102 x 80

Opis produktu

Większość osób o badaniu wysycenia krwi tlenem dowiaduje się dopiero wtedy, gdy pojawia się problem. W najczęstszym przypadku mowa o niewydolności krążenia lub zaburzeniu układu oddechowego. Najlepszym rozwiązaniem jest w porę wykryć nieprawidłowości w funkcjonowaniu naszego organizmu - w tym pomoże nam Pulsoksymetr. Dzięki temu błyskawicznemu i bezinwazyjnemu badaniu, możemy ocenić i dowiedzieć się jak pracuje nasz układ krwionośny i oddechowy.

Pulsoksymetr napalcowy jest wykorzystywany do odczytu najważniejszych parametrów życiowych (u osób starszych, dorosłych a także u dzieci od 4 roku życia) takich jak tętno oraz wysycenie krwi tlenem (saturacja).



Zastosowanie pulsoksymetru: - przy kontroli tlenoterapii, u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami oddychania - w zaawansowanych chorobach układu oddechowego - w zaostrzeniach astmy czy innych schorzeniach dróg oddechowych - w nagłych przypadkach, kiedy podejrzewamy, że u pacjenta występuje niedotlenienie organizmu: wypadki, poparzenia, zatrucia, wstrząs krwotoczny, amputacja kończyny, duży ubytek krwi, atak astmy, wstrząs anafilaktyczny - monitorowanie chorych z anemią - w medycynie sportowej w badaniach wydolnościowych u sportowców - podczas zabiegów operacyjnych przeprowadzanych, w znieczuleniu ogólnym oraz w okresie pooperacyjnym - u pacjentów w śpiączce klinicznej - w wybranych jednostkach chorobowych takich jak choroba wysokościowa oraz ksenonowa - do rozpoznania niewydolności oddechowej, wówczas kiedy u chorego nie występują specyficzne objawy kliniczne.